

โรคเรื้อน

โรคติดต่อเชื้อร้ายที่เกิดจากเชื้อ *Mycobacterium leprae* (*M. leprae*)
ทำให้เกิดอาการที่เส้นประสาทและผิวหนัง

การแพร่เชื้อ

เชื้อโรคเรื้อนออกจากร่างกายผู้ป่วยได้ 2 ทาง

1. ทางเยื่อจมูก
2. ทางผิวหนังที่แตกเป็นแผล



อาการ

มีรอยโรคทางผิวหนัง มีอาการชา
หรือพบการขมับร่วงได้ หากมีอาการมาก
จะมีผื่นนูนแดงหนา หรือมีตุ่มแดงไม่คัน



การรักษา

สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยกินยาติดต่อกัน
เป็นเวลา 6 เดือนหรือ 2 ปี แล้วแต่ชนิดของโรค



การป้องกัน

ควรหมั่นดูแลผิวหนัง และหากมีอาการเหล่านี้
“ผิวหนังเป็นวงด่าง สีจาง หรือเข้มกว่าสีผิวปกติ
และมีอาการชาร่วมด้วย” ให้รีบไปพบแพทย์



ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค / สถาบันราชประชาสมาสัย. (ร่าง)แนวทางการสอบสวนโรคเรื้อน พ.ศ. 2567



ข้อมูลวันที่ 19/7/67

สคร.5
ราชภัฏวชิร

☎ 1422
สายด่วนกรมควบคุมโรค

โรคติดต่อ หน้าฝน

รู้ไว้ให้ระวัง!

1. กลุ่มเชื้อโรคที่ผ่านการบาดแผล หรือเชือบุผิวหนัง



ตัวอย่างโรค

ตาแดง, ฝีฝีหนุ

สาเหตุ

สัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค

การป้องกัน

ไม่ลุยน้ำจืด, ใส่รองเท้าบูท

2. กลุ่มโรคติดต่อทางน้ำ และอาหาร



ตัวอย่างโรค

ท้องเดิน, ท้องร่วง, อาหารเป็นพิษ

สาเหตุ

กินอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค

การป้องกัน

กินพอร้อน, ใช้อ่อนกลาง, ล้างมือ

3. โรค มือ เท้า ปาก



ตัวอย่างโรค

ส่วนใหญ่มักพบในเด็ก อายุต่ำกว่า 10 ปี

สาเหตุ

เด็กสัมผัสสารคัดหลั่งที่มีเชื้อปนเปื้อน

การป้องกัน

ดูแลสุขอนามัย, ตัดเล็บให้สั้น
ล้างมือบ่อย ๆ

5. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ



ตัวอย่างโรค

หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ปอดบวม

สาเหตุ

รับเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
ในอากาศ

การป้องกัน

ใส่หน้ากาก, ล้างมือบ่อย ๆ

4. กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะ



ตัวอย่างโรค

ไข้เลือดออก, ไข้สมองอักเสบเจดี
ไข้มาลาเลีย

สาเหตุ

ติดต่อโดยการถูกยุงกัด

การป้องกัน

ทายากันยุง, อยู่ห่างจากที่มุงชุม
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



PRD

ที่มา : กรมควบคุมโรค

โรคปอดอักเสบ



กรมทรวงอก
Department of Respiratory System



กรมควบคุมโรค
Department of Hospital Infection



เกิดจากการติดเชื้อที่ถุงลมปอด (Alveoli)
ภายในเนื้อเยื่อปอด ซึ่งเชื้อก่อโรคส่วนใหญ่
เป็นได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส



การติดต่อ

หายใจเอาเชื้อ
เข้าสู่ปอดโดยตรง
แพร่กระจาย
ทางกระแสเลือด
การสัมผัสสิ่งปนเปื้อน



อาการ

ไข้ ไอ หายใจเร็ว หอบเหนื่อย
หายใจลำบาก

..อาการแสดงอื่นๆที่ไม่จำเพาะ..
ท้องอืด อาเจียน ชีบ

ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมักจะมีภาวะหายใจล้มเหลว และมีโอกาสเสียชีวิต



การป้องกัน




ล้างมือบ่อยๆ
หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย



กลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ
ควรได้รับวัคซีน



หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น
ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ควันไฟ ควันบุหรี่



เฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค



ฉบับวันที่ 7/11/67

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

